



<b>OBAVEŠTENJE</b>	<b>FLETË INFORMACIONI</b>
<b>Tablete kalijumjodida od 65mg iz Vojne apoteke</b>	<b>Kaliumiodid tableta 65 mg, farmacia e ushtrisë</b>

**Cemu sluze tablete kalijumjodida?**

U sluzaju teske havarije u atomskoj centrali sa razaranjem sigurnosnog oklopa, moze u okolinu pored ostalih supstanci dospeti i radioaktivni jod. Udisanjem on dospeva do stitnjače, gde se taloži. Blagovremenim uzimanjem tableta kalijumjodida sprečava se prodiranje radioaktivnog joda u stitnjaču.

**Kako se preventivno dele tablete kalijumjodida?**

Ukoliko stanujete u pojasu od 20 km oko atomske centrale (1. i 2. zona) dostavice Vam nadležna sluzba preventivno i besplatno tablete kalijumjodida na kućnu adresu.

(U apoteci mozete kupiti dodatne količine kalijumjodida, ako zelite.)

**Kada odredjuju nadležne institucije stavljanje tableta na raspolaganje stanovništvu odn. uzimanje tableta kalijumjodida?**

U javnosti se proglašava uzbuna, ukoliko postoji opasnost od isticanja radioaktivnih supstanci prilikom teske havarije u atomskoj centrali. Odgovarajuća obaveštenja naci čete na poslednjim stranicama telefonskog imenika i to u rubrici «Znak za uzbunu/Opšta uzbuna/ Ponašanje u sluzaju opasnosti».

**Na šta treba obratiti pažnju pri uzimanju tableta kalijumjodida?**

**Uzimanje tableta:** Tablete se prvi put uzimaju po odgovarajućem naredjenju vlasti — i to sa puno tečnosti. Nadležne sluzbe nadalje takode naredjuju koliko dugo treba uzimati tablete.

**Doziranje**

Pogledajte uputstvo za uzimanje leka, koje je priložena pakovanju.

**Propisi o čuvanju leka**

Tablete treba čuvati u zatvorenom originalnom pakovanju na sobnoj temperaturi (15°C–25°C) na suvom mestu (npr. u spavaćoj sobi). Molimo Vas, da tablete stavite tamo gde čete ih sigurno pronaći kad Vam zatrebaju, ali u svakom sluzaju van dohvata dečijih ruku.

Za daljnja obaveštenja obratite se lekaru/lekarki ili apotekaru/apotekarki.

**Për çfarë duhen tabletat me Kaliumiodid?**

Në rastet e një aksidenti të rëndë në një central bërthamor me thyerjen e (Bruch des Sicherheitsbehälters) të sigurisë, mund të çlirohet përveç substancave të tjera edhe iodium radioaktiv në ambient. Ky iodium radioaktiv thihet nëpërmjet ajrit dhe grumbullohet në gjendrën tiroide. Tabletat me Kaliumiodid parandalojnë grumbullimin e iodiumit radioaktiv në gjendrën tiroide, në qoftë së pihen tabletat në kohë.

**Në çfarë mënyrë dorëzohen tabletat me Kaliumiodid?**

Në qoftë se banoni brënda një rrethi prej p.a. 20km larg nga një central bërthamor (Zonë 1 + 2) atëherë autoritetet përgjegjës ju dërgojnë tabletat për parandalim falas në shtëpi.

(Në qoftë se doni të merrni tableta shtesë me Kaliumiodid, atëherë mund të blini ato në farmaci.)

**Kur mund të urdhërojnë autoritetet përgjegjës përgatitjen dhe pirjen e tableta-ve?**

Publiku alarmohet në rastet e një rreziku të një aksidenti të rëndë në një central bërthamor ku mund të çlirohen lëndë radioaktive. Ju mund të gjeni informacionet në lidhje me këtë në faqen e fundit të librit të numrave telefonik «Alarmimi i publikut / Alarm i përgjithshëm/ Sjellja në rastet e një rrëziku «Alarmierung der Bevölkerung/ Allgemeiner Alarm/Verhalten bei Gefährdung».

**Çfarë duhet të vihet re për përdorimin e tableteve me Kaliumiodid?**

**Pirja e tableteve:** Tabletat duhen pirë për herë të parë sipas urdhërave të autoriteteve — he duhen pirë me shumë lëngje. Autoritetet do të vendosin edhe për sa dite duhen pirë tabletat.

**Dozë**

Shikoni prospektin në kuti.

**Regullat për konservim**

Tabletat duhen mbajtur në kutinë originale të mbyllura, me një temperatur prej 15 °C deri 25 °C (p.sh. në dhomën e gjumit), të mbrojtura nga drita dhe lagështira. Ju lutemi mbani ato në një vend, ku mund ti gjeni ato përsëri dhe në largësi të pa aritëshme për fëmijët.

Informacione të tjera ju jep mjeku/mjekja juaj ose farmacisti/farmacista juaj.

**Ordu Eczanesinden potasyum iyodid 65 mg tabletleri**

**Potasyum iyodid tabletleri ne işe yarar?**

En caso de un grave accidente en una central nuclear, con rotura del depósito de seguridad, puede producirse el escape al ambiente de yodo radioactivo, entre otras sustancias. Las personas o insipran con el aire y el yodo se concentra en el tiroides. Las pastillas de yodo potásico previenen la asimilación de yodo radioactivo en el tiroides, en tanto que se tomen a tiempo.

**De qué forma se realiza la distribución preventiva de pastillas de yodo potásico?**

Si vive en un radio de aproximadamente 20 km de una central nuclear (Zonas 1 + 2), las autoridades responsables le gratuita las pastillas de yodo potásico en su casa.

(En caso de que necesite pastillas de yodo potásico adicionales, las puede adquirir en farmacias.)

**En qué momento ordenan las autoridades la provisión e ingestión de las pastillas?**

Si existen el peligro o de que se liberen sustancias radioactivas debido a un grave accidente en la población, hallará más informaciónes al respecto en las últimas páginas de la guía telefónica: «Alerta de la población /Atama general/Comportamiento en caso de peligro».

**¿Qué debe tenerse en cuenta al tomar pastillas de yodo potásico?**

ingieren una primera vez — con abundante líquido — después de las correspondiente disposición de las autoridades. A continuación, las autoridades indicará durante cuántos días habrá que continuar tomando las pastillas.

**Posología**

Vase prospecto adjunto al embalaje. **Prescripciones para la conservación** Conserve las pastillas en el envase original cerrado, en un lugar seco y a temperatura ambiente (15 °C y 25 °C) (p.ej. en el dormitorio). Guarde las pastillas en un lugar fácil de encontrar y fuera del alcance de los niños.

**Muhafaza etme kuallari**

Tabletleri eqimamış orijinal ambalajı içersinde kuru bir yerde muhafaza ediniz (ör. yatak odasında). Lütfen tabletleri lazim ölçüde bulabildiğinizden emin olunuz. **Dozaj:** Ambalajı içindeki prospektüse bakınız.

Daha geniş bilgiyi doktorunuzdan ya da eczacınızdan edinebilirsiniz.